DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES D'ALGÉRIE

par L. Fairmaire.

Cebrio piceiventris. — Long. 11 1/2 mill. — *Oblongus, modice convexus, longitudinaliter arcuatus, rufus, nitidus, capite fusco, pectore (prosterno excepto), coxis pedibusque fuscis, ore ferrugineo, abdomine fusco-piceo, piceo maculoso, lateribus et apice rufo-picescente, antennis palpisque piceis; capite grosse punctato, antice impressiusculo, clypeo antice truncato, antennis sat gracilibus, apicem versus gracilioribus, ciliatis, articulo ultimo appendiculato; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus antice ad angulis rotundatis, angulis posticis gracilibus, brevibus, dorso sat dense punctato; scutello ovato, leviter concavo, apice obtuso; elytris sat fortiter punctatis, levissime costulatis, basi lævioribus; subtus punctulatus, pilosus metasterno medio levissime carinulato, abdomine punctato, segmentis penultimis apice pallidius marginatis.* — Biskran.

Ressemble beaucoup au *nigriceps*, mais la coloration de l'abdomen est différente, le chaperon n'est pas rebordé en avant et présente une large impression en angle obtus, peu marquée, les antennes sont moins larges, l'écusson est étroit, atténué vers l'extrémité, les élytres ne sont pas striées et présentent des côtes minces à peine marquées.

Cebrio pellucidus. — Long. 11 mill. — *Sat elongatus, mollis, dilute fulvus, nitidus, sat dense breviter pilosulus, capite levissime rufescente, dense punctato, inter oculos impressiusculo, clypeo antice late arcuato, mandibulis apice fuscis; antennis sat gracilibus, corporis medium attingentibus, ciliatis, articulis apice evidenter angulatis, ultimo breviter appendiculato; prothorace sat parvo, elytris angustiore, brevi, lateribus antice tantum arcuatis, margine antico sat fortiter rotundato, dorso sat dense punctato, angulis posticis brevibus; scutello apice rotundato, ante apicem transversim sulcatulo; elytris oblongis, postice attenuatis, apice obtuse acuminatis, dorso sat dense punctatis, leviter substriolatis, postice evidentius striatis, intervallis a medio leviter costulatis, parte basali sat lævi, posticali paulo rugosula et punctis majoribus, suturam versus præcipue impressa; subtus subtiliter punctulatus, abdomine lateribus impresso.* — Ghardaia.

Ressemble beaucoup au *filicornis*, en diffère par le corps plus mou, d'une coloration plus pâle avec la tête concolore, la fossette frontale médiane peu distincte et les antennes plus grêles.

Anemia striolata. — Long. 3 1/2 mill. Ressemble beaucoup à la *rotundicollis* Desb , même taille et même coloration, mais plus large; le corselet est arrondi sur les côtés avec les angles postérieurs, les élytres sont plus rugueuses avec quelques stries distinctes; le chaperon est moins largement échancré, les tibias antérieurs ont, à la base en dehors, quelques fines denticulations, et aux tibias postérieurs la dent médiane est plus forte. — Guer el-Alia, Sahara algérien ; prise pendant la nuit.

CARISTELA n. g.

Corpus gracile. Oculi maximi, grosse granulati, contigui ♂ parum distantes. Palpi maxillares articulo ultimo cultriformi, acuto. Antennæ sat graciles, corporis medium paulo superantes, articulis 3-10 apice paulo angulatis, 11° breviore et graciliore. Prothorax vix transversus, subconicus, elytris valde angustior ♂, transversus, vix angustior ♀, antice angustatus, angulis posticis exsertis, sat acutis ♂, rectis haud acutis ♀. Elytra oblonga. Prosternum angustum, processus intercoxalis acutus. Pedes graciles, unguibus subtilisime vix perspicue denticulatis, tarsis articulo penultimo breviter lamellato.

Ce genre est voisin des *Cistela* dont il diffère par le corps plus grêle, les yeux très gros, contigus ou peu écartés, les hanches antérieures globuleuses. Ce sont des insectes nocturnes qui ont été capturés pendant la nuit. Il diffère des *Allecula* par les tarses n'ayant qu'un article faiblement lamellé et les yeux rapprochés.

C. megalops. — Long. 6 1/2 mill. — *Oblongo-elongata, modice convexa, rufula, nitidula, pubescens, fronte cum oculis nigra; prothorace densissime subtiliter punctulato, lateribus vix marginato, basi medio recta, utrinque sinuata; scutello acuto, punctato; elytris ad humeros sat rotundatis, subparallelis, apice conjunctim rotundatis, dorso densissime subtiliter rugosulo-punctatis, fere transversim plicatulis, subtiliter striatis, basi utrinque ad scutellum leviter elevatis, stria suturali et striis 2 primis apice punctatis; subtus dense subtiliter rugosulo-punctulata, abdomine apicem versus gradatim obscuriore, segmentis 2 penultimis apice anguste pallido marginatis, ♀ capite minus infuscato, abdomine haud infuscato.* — Ouargla, Ghardaia, Biskra (Bedel), Ainsefra (Hénon), Tunisie sud (Sédillot).

Cet insecte est remarquable par le développement des yeux et sa forme grêle. La ♀ est moins étroite avec le corselet plus large, mat, ainsi que la tête, et un peu brunâtre; les antennes sont enfumées à l'extrémité.

La *Cistela ocularis* Fairm., d'Obock, pourrait bien appartenir au même genre.

Meloe cœlatus Reiche. — Un individu en mauvais état, pris à l'Ouetd N'Sa, se rapporte très bien à l'espèce syrienne, et n'en diffère que par les antennes un peu moins allongées. C'est peut-être une différence sexuelle.

Ananca obsoleta. — Long. 9 mill. — *Elongata, sat convexa, dilute flavido-testacea, nitidula, dense flavido-pilosella; capite breviter ac obtuse triangulari, sat dense punctulato, oculis integris, labro denudato, nitidiore, antennis gracilibus, corporis medium attingentibus, articulo 3° quarto paulo breviore; prothorace ovato, elytris angustiore, postice angustato, lateribus basin versus vix sinuatis, dorso planiusculo, sat dense punctulato, basi subtiliter marginato, scutello subquadrato, medio sulcatulo; elytris postice attenuatis, apice obtusis, dense subtiliter ruguloso-punctatis, utrinque lineis 3 vix indicatis; subtus longius pilosella, tarsis sat crassis*. — Ouargla.

Cet insecte ressemble à l'*A*. (*Nacerdes*) *fuscostrigosa* Fairm. du Souf, mais ce dernier a le corselet maculé de brun, impressionné au milieu, l'écusson triangulaire avec une tache brune et une impression à la base et les élytres à 4 bandes brunes dénudées.

On trouve une autre espèce du même genre, dans le nord de l'Afrique, *Nacerdes carinata* Karsch, de la Tripolitaine, plus grande (10 à 11 mill.), les antennes sont plus longues, les élytres ont chacune 3 côtes distinctes et la coloration est sombre.

Ces insectes ont été recueillis dans le sud de l'Algérie par M. le Dr Krauss, et j'en dois la communication à l'obligeance de M. le Dr Vosseler, de Stuttgard.

Titubæa minor. — Long. 4 1/2 mill. — *Oblonga, convexa, nitida nigra, prothorace elytrisque dilute flavidis, illo basi magis rufescente, ore, antennarum basi pedibusque rufis, tarsis fuscis, scutello nigro, elytris utrinque punctis 4 nigris ornatis, 1° humerali, 2°-3°que post medium transversim dispositis, 4° majore anteapicali; capite planiusculo, paulo inæquali, albido-sericante, antennis fortiter dentatis; prothorace transverso, elytris parum angustiore, antice leviter attenuato, angulis anticis cum margine antico rotundatis, margine postice utrinque late sinuato, angulis rotundatis, dorso laxe sat fortiter punctato, intervallis subtilius ac rarius punctulatis; scutello pilosulo, apice lævi; elytris sat brevibus, basi levissime dilatatis, apice rotundatis, dorso punctato-rugatulis, basi anguste læviore; subtus argenteo-sericans, dense subtiliter punctato, segmento ventrali ultimo utrinque sat fortiter sulcato, pedibus anticis longioribus, tibiis arcuatis*. — Un seul ♂, Ouargla, bordj Dzelfana.

Ressemble à l'*octopunctata*, notamment pour la coloration du

corselet mais bien plus petite, les élytres plus rugueuses, ayant aussi de chaque côté 4 points, mais différemment placés.

J'ajoute à ces descriptions celle d'un Aphodien des mêmes régions qui m'a été donné par M. Bedel.

SITIPHUS n. g.

Forme et facies des *Mendidius*, en diffère par le chaperon, à peine sinué au milieu du bord antérieur qui est légèrement rebordé ; toute la tête est couverte de rugosités fines et serrées avec une carène frontale transversale ; les tibias antérieurs sont armés de 3 fortes dents, aiguës ; les fémurs postérieurs sont très larges, brièvement ovalaires, comprimés, les tibias postérieurs sont courts, presque coniques, non échancrés, les tarses sont plus courts. Chez les *Mendidius*, le chaperon est bidenté ou biangulé, non rebordé, nettement sinué au milieu ; les fémurs postérieurs sont assez larges, mais moins fortement, et les tibias postérieurs sont plus longs, biéchancrés en dessus.

S. Brisouti. — Long. 4 mill. — *Parum oblongus, convexus, postice vix ampliatus, rufescens, nitidus, capite prothoraceque vix obscurioribus, hoc lateribus vix dilutiore, sutura et scutello paulo magis rufescentibus, prothorace sat dense æqualiter punctato, basi marginato; scutello punctato; elytris punctulato-striolatis, intervallis fere planis, laxe subtiliter punctulatis.* — Aïn-Sefra (Bedel).

Trouvé aussi à Tougours par notre collègue M. Pic.

Cet insecte ressemble beaucoup au *Mendidius granulifrons* Fairm., de Biskra (*Ann. Belg.*, *C. R.*, mars 1883), qui a le chaperon fortement bidenté et qui ne me paraît pas le même que le *granulifrons* Reitt., des bords de la Caspienne et du Turkestan. Ce dernier prendra le nom de *Reitteri*. Mon *granulifrons* ne serait-il pas le *rutilinus* Reitt. ? Mais la description ne parle pas des dents du chaperon.